

Obstbau- Pflanzenschutz- warndienst

**Montag, 26. Mai 2025,
16:00 Uhr**

Wetter

Dienstag ab Mittag trocken. Ab Mittwoch-Mittag bis Donnerstag wieder regnerisch. Danach trocken. Ab Sonntag erneut Regen.

Kernobst

Schorf: Wo die letzte Spritzung vor dem 23. Mai war, oder Mittel mit geringer Regenfestigkeit verwendet wurden, möglichst morgen einen neuen Belag aufbringen, zB mit Delan oder Captan (Nebenwirkung gg. Kelchfäule), *in Bio Schwefelkalk (bienengefährlich!) oder bei verträglichen Sorten Kupfer*. Allfällige Symptome der Infektionsphasen vom 24.-26.4. und vom 4.-6.5. sollten jetzt sichtbar sein. Bestände kontrollieren (mind. 100 Langtriebe pro Sorte).

Der Schorfspritzung Netzschwefel gg. **Mehltau** zugeben, *auch Bio*. (nicht bei Schwefelkalkanwendung, die allein auch gg. Mehltau wirkt). Mehltautriebe laufend ausbrechen.

Das kühle Wetter auch zu **Blattdüngungen** nutzen!

Feuerbrand-Symptome aus der Infektionsphase vom 30.4.-4.5. sollten spätestens bis Ende dieser Woche auch bei Apfel sichtbar sein. Anlagen kontrollieren!

Die Eiablage des **Apfelwicklers** hat begonnen. Erste Larven sind aber erst ab Anfang Juni zu erwarten. Daher noch keine Behandlung nötig.

Steinobst

Strategie **KirschESSIGfliege**: Rechtzeitig vor der einsetzenden Reife die Netze schließen. Bei Befall von Einzelbäumen diese rasch abernten und Sortenblock behandeln, z.B. mit Spintor, WZ 3 T (*auch Bio, bienengefährlich!*).

Strategie **KirschFRUCHTfliegen**: Bei Fallenfängen: Ab dem Umfärben der jeweiligen Sorte ein bis zwei Behandlungen durchführen, z.B. mit Mospilan (WZ 7 Tage). *Kein Bio-Mittel verfügbar*. Mospilan nicht mit Fungiziden der Gruppe FRAC 3 (=FRAC G1) mischen, z.B. Score, Luna Veggie, Topas etc.! Die Mischung wirkt bienengefährlich.

Blattkrankheiten/Fruchtfäulen: Bei Kulturen ohne Überdachung vor Niederschlägen ca. alle 10 Tage eine Behandlung gg. Blattkrankheiten bzw. Fruchtfäulen durchführen, zB mit Score (Wartezeit 14 T.), Switch (WZ 14 T), Signum (WZ 7 T) oder Teldor (WZ 3 T), *in Bio: vorbeugend Kumar (WZ 1 T) oder abstoppend aufs nasse Laub Curatio (bienengefährlich) bzw. Vitsan plus Netzschwefel plus Netzmittel.*

Pflanzenschutzbehandlungen auch zu **Blattdüngungen** nutzen!

Ausdünnung Zwetschken: Der Behang ist unterschiedlich. Sorten kontrollieren. Anhaltspunkt: Max. 35-40 Früchte pro Laufmeter Fruchtholz.

Die Schweizer Kollegen empfehlen bei folgenden großfrüchtigen Sorten:

- Cacaks Fruchtbare: 25-30 Früchte/lfm.
- Fellenberg: 25-30 Früchte/lfm.
- Dabrovice: 20-25 Früchte/lfm.
- Tophit: 20-25 Früchte/lfm.

warndienst.at <input type="checkbox"/>	Mail <input type="checkbox"/>	Fax <input type="checkbox"/>	hortigate <input type="checkbox"/>	WhatsApp <input type="checkbox"/>
---	--	--	--	--